

FCO – Vaccination

Fiche récapitulative – source Matthias Dahuron (BRACSVET)

Pourquoi vacciner ?

- ➔ Réduire les symptômes, l'impact de la maladie et la mortalité (BTV3 et BTV4-8)
- ➔ Réduire la virémie : diminution de la contamination des culicoïdes, diminution de la contagiosité aux autres animaux

Qui vacciner et quand?

- ➔ Tous les animaux de plus de 3 mois
- ➔ Le plus rapidement possible selon le stade physiologique et le statut sanitaire



<p><u>Stade physiologique :</u> Pas de vaccination 3 semaine avant et après la mise en lutte, pas les mâles 2 mois avant la reproduction, pas les femelles avant la mise-bas</p> <p><u>Statut sanitaire :</u> Ne pas vacciner en présence du virus et les animaux carencés.</p>

Infos et stocks vaccins

vaccin	Espèces cibles	Nb injections	Séroconversion (mise en place de l'immunité)	stock
BTV Pur 4 et 8	Bv, Ov, autres	2 à 3-4 sem d'intervalle	3 semaines	Stock important mais gros retards de livraison liés à la forte demande
Bluvac 8	Bv, Ov, autres	2 à 3-4 sem d'intervalle	31 jours bovins / 21 jours ovins	Rupture jusqu'en décembre 2024
Syvazul 4 et 8	Ovins en priorité	1 injection	39 jours	Rupture jusqu'en novembre 2024
Bultavo 3	ovins	1 injection	3 semaines	Sous autorisation temporaire d'autorisation pour les départements en zone régulée FCO3, réception aléatoire selon approvisionnement
Bluevac 3	Bv , ov	2 injections à 3-4 sem d'intervalle	3 semaines	Sous autorisation temporaire d'autorisation pour les départements en zone régulée FCO3, réception aléatoire selon approvisionnement

➔ Rapprochez-vous rapidement de vos vétérinaires si vous souhaitez avoir des doses